

I amb la calor arriben les picades



► Les picades normalment produeixen molèsties menors. Però en alguns casos, com en els nens o les persones grans, poden generar complicacions de salut



proporció més gran de verí. Altres factors a tenir en compte són l'estat de salut previ del pacient (ancians, immuno-deprimits) i la localització de la lesió. La cara, la boca i el coll són les zones amb més risc de complicacions". I afegeix que "cal estar alerta davant dels edemes extensos, és a dir, aquells que sobrepassin l'arrel de l'extremitat afectada, dificultats per respirar o vermellor en zones allunyades de la picada".

Si tot i haver actuat per reduir-la, les molèsties continuen o generen tremolor, nàusees, mareig o dolor intens, el metge recomana anar a un centre sanitari.

REDACCIÓ. FIGUERES

■ Amb la pujada de les temperatures arriben les picades d'insectes o d'animals marins. Generalment, produeixen molèsties menors que milloren amb el temps. Malgrat això, en alguns casos es poden complicar i requerir tractament. Tal com explica el metge de l'ABS l'Escala Vishal Shahani, "les picades més freqüents són les d'abelles, vespes i formigues i en alguns casos poden comportar reaccions greus i, fins i tot, comprometre la vida del pacient".

Shahani adverteix que "un factor de gravetat en picades o mossegades d'animals verinosos és l'edat, ja que els nens, pel seu menor pes, reben una



LES PICADES PERILLOSES

Les manifestacions clíniques poden variar, des de lesions locals com ara vermellor, edema, picor, febre o dolor, fins a quadres més asimptomàtics. Alguns insectes i animals marins que poden generar problemes si ens piquen són:

- ✓abelles
- ✓vespes
- ✓formigues
- ✓tàvecs
- ✓mosquits
- ✓mosques, sobretot la varietat coneguda com a mosca negra

- ✓escorpi de terra
- ✓aranya
- ✓paparra
- ✓puça
- ✓medusa
- ✓eriçó de mar
- ✓escorpi de mar
- ✓sagonera



Com evitar les picades

Vishal Shahani aconsella "a la platja, portar calçat aquàtic i no banyar-se els dies de mala visibilitat. I per evitar els insectes, no anar a zones amb aigua estancada o bassals i usar repel·lents, especialment per als mosquits".

En el cas de les persones al·lèrgiques, "es recomana dessensibilització progressiva, portar antihistamínic i instruccions en l'auto-administració d'adrenalina".

QUÈ S'HA DE FER SI ENS HAN PICAT?

D'INSECTE

- ☹ 1. Extraieu el fibló. Si feu servir pinces, procureu no enfonsar-lo encara més ni escampar el verí.
- ☹ 2. Renteu bé la zona afectada amb aigua i un sabó neutre.
- ☹ 3. Apliqueu-hi una gasa o roba neta amarada amb aigua freda.
- ☹ 4. Podeu posar-hi un preparat farmacèutic a base d'amoníac o bé fred (gel).
- ☹ 5. En cas de picada a l'interior de la boca, doneu a la víctima gel per llepar o aigua freda.
- ☹ 6. No rasqueu ni fregueu la zona.
- ☹ 7. En casos greus, els serveis sanitaris d'emergències poden administrar l'antídote.

DE MESUSA

(la més freqüent en medi aquàtic)

- ☹ 1. Sortiu de l'aigua.
- ☹ 2. No us grateu ni us fregueu la zona afectada amb tovalloles o altres peces de roba.
- ☹ 3. Retireu les restes de tentacle (amb pinces o guants) i renteu la ferida amb aigua salada.
- ☹ 4. No utilitzeu mai aigua dolça, ja que activa les cèl·lules i augmenta la quantitat de toxina.
- ☹ 5. Ompliu una bossa de plàstic amb gel i apliqueu-la com més aviat millor, durant uns cinc minuts, sobre la zona de la picada (mai no heu de posar el gel directament sobre la pell).
- ☹ 6. Si la coïssor no para, podeu aplicar fredor una altra vegada, durant cinc minuts més.
- ☹ 7. Per evitar la infecció de la ferida, s'aconsella que apliqueu sobre la pell un antisèptic (alcohol iodat) tres o quatre vegades al dia durant 48-76 hores.

